

chwycić  
pomocną dłoń

---

najlepsi specjaliści  
chirurgii plastycznej  
i chirurgii dłoni



# Najlepsi specjaliści chirurgii plastycznej

Operuje dr. Katarzyna Osiak - chirurg plastyk

**Choroba Dupuytrena** – jest to powolnie rozwijająca się choroba, która powoduje przykurcz palców ręki spowodowany przez włókniejące pasma tkanki ścięgnowej. Najczęściej przykurcz dotyka palca serdecznego i małego, stopniowo pogłębiając się powoduje zamknięcie palców dłoni. Choroba ta występuje głównie u mężczyzn. Oferujemy leczenie choroby Dupuytnera operacyjnie poprzez wycięcie tkanki przykurczającej w znieczuleniu przewodowym pod pachą. Ręka pozostaje po zabiegu w gipsowej łusce, a drenik z rany usuwamy następnego dnia po operacji. Szwy i opatrunek zdejmujemy po 8 – 12 dniach.

**Leczenie operacyjne daje gwarancję powrotu do pełnej sprawności.**

**Zespół cieśni kanału nadgarstka** – to zespół objawów spowodowany uciskiem nerwu w nadgarstku. Objawy występowania tego zespołu, to drętwienie dłoni, mrowienie, ból nasilający się często w nocy. Przyczyny to przebyte stany zapalne, urazy, choroba reumatyczna, przeciążenie nadgarstka pracą fizyczną lub nadmierną aktywnością. Oferujemy leczenie operacyjne, które daje natychmiastową ulgę w bólu i gwarancję powrotu do pełnej sprawności. Operacja odbywa się w znieczuleniu przewodowym pod pachą, w trakcie której na wewnętrznej stronie dłoni wykonane jest małe cięcie. Po zabiegu ręka pozostaje w gipsowej łusce, która unieruchamia nadgarstek. Drenik wyprowadzony z rany pooperacyjnej wyjmujemy następnego dnia po operacji. Gips i szwy zdejmujemy po 8-12 dniach. **Do pracy można wrócić po trzech tygodniach rekonwalescencji.**

w ofercie posiadamy także:

**Plastykę odstających uszu** – zabieg ten odbywa się w znieczuleniu miejscowym w sali operacyjnej i trwa około 1,5 godziny. Pacjent po zabiegu wychodzi do domu. Następnego dnia konieczne jest stawienie się na zmianę opatrunku. Szwy zdejmujemy po 14 dniach. Po zabiegu konieczne jest noszenie opaski przez kolejne 3 miesiące.

**Znamiona - usunięcie** – zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym w gabinecie zabiegowym. Znamię na zlecenie lekarza lub prośbę pacjenta może być przebadane histopatologicznie. Szwy usuwamy po 10-14 dniach.

**Blizny** - usuwamy chirurgiczne, wycięcie blizny wykonujemy w znieczuleniu miejscowym na sali operacyjnej. Szwy usuwamy po 14-18 dniach.

**Tatuaże** - wycięcie chirurgiczne tatuażu to jedyna skuteczna metoda na pozbycie się niechcianej „ozdoby” ciała. Oferujemy zabieg, który przeprowadzamy w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym. Zabieg przeprowadza chirurg plastyk, który zakłada szwy plastyczne dające gwarancję jak najmniejszej blizny. Pacjent stawia się do kontroli co 3-4 dni, szwy zdejmujemy po 18 dniach.

## Przychodnia - konsultacje:

ul. Szlenkierów 1, 01-181 Warszawa

tel. 22 862 46 00

e-mail: [przychodnia@szpitalibis.pl](mailto:przychodnia@szpitalibis.pl)